


|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <br>LGS-MEGALAB | <b>PNT</b><br><b>Pre-AC019</b><br><b>HELICOBACTER PYLORI EN</b><br><b>ALIENTO</b> |                      |
| <b>Edición:</b> 1 <sup>a</sup>   | <b>Fecha:</b> 26/04/2016  | <b>Página 6 de 6</b> |

## ANEXO I

### CONDICIONES PRUEBA HELICOBACTER PYLORI EN ALIENTO

#### AYUNAS

Ayunas (tanto de líquidos como de sólidos) durante 8 horas como mínimo, preferentemente por la noche.

#### MEDICAMENTOS E INTERVENCIONES MÉDICAS

En el caso de tratamiento con antibióticos sistémicos debe esperarse 4 semanas para realizar la prueba.

En el caso de tratamiento con agentes antisecretores (cimetidina, ranitidina, omeoprazol, misoprostol, etc.) debe esperarse 2 semanas después de la última dosis para realizar la prueba.

#### TABACO E HIGIENE BUCAL

**NO** puede fumar y **NO** debe lavarse los dientes antes de venir al laboratorio.

#### Notas:

- ✓ No se recomienda realizar el test a mujeres embarazadas ni lactantes.
- ✓ No deben realizar la prueba los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa.