

 LGS-MEGALAB	PNT Pre-AC019 HELICOBACTER PYLORI EN ALIENTO	
Edición: 2ª	Fecha: 17/06/2019	Página 10 de 10

ANEXO II

CONDICIONES PRUEBA H. PYLORI EN ALIENTO PRUEBA TAUKIT (ISOMED)

AYUNAS

Ayunas (tanto de líquidos como de sólidos) durante 8 horas como mínimo, preferentemente por la noche.

MEDICAMENTOS E INTERVENCIONES MÉDICAS

En el caso de tratamiento con antibióticos sistémicos debe esperarse 4 semanas para realizar la prueba.

Durante los 15 días previos **NO TOMAR** Omeprazol, Lansoprazol, Ansoprazol, Esomeprazol, Pantoprazol, Rabeprazol... u otro inhibidor de la bomba de protones o con sales de bismuto, *siempre consultando previamente a su médico.*

Si está permitido tomar ranitidina, cimetidina, famotidina, nizatidina, ...almox y medicación crónica como son los tratamientos para colesterol, diabetes, tiroides, tensión

TABACO E HIGIENE BUCAL

Si está permitido lavarse los dientes y Si está permitido beber agua.

Abstenerse de fumar al menos 8 horas antes de la realización de la prueba.

Notas:

- ✓ No se recomienda realizar el test a mujeres embarazadas ni lactantes.
- ✓ No se recomienda su realización a pacientes menores de 5 años.
- ✓ Informe a su médico si ha sufrido una extirpación parcial de su estómago (gastrectomía).

LA PRUEBA DURA 40 MINUTOS APROXIMADAMENTE