

ORINA DE 24 HORAS: DETERMINACIÓN DE ACIDO VANILMANDELICO

PARA OBTENER UN RESULTADO FIABLE LE ROGAMOS SIGA LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Los 3 días anteriores a la prueba **NO TOMAR:**

Alimentos: plátanos, vainilla, galletas, helados, café, cacao, chocolate o té.

Durante las 2 semanas previas **SUPRIMIR** el tratamiento con:

Medicamentos que contengan: L-Dopa, litio, adrenalina, clonidina, disulfirám, ácido salicílico, ácido nalidíxico, guanetidina, imipramina, IMAO, levadopa, fenotiazinas y reserpina, piridoxina, amoxicilina, diuréticos y vasodilatadores. La supresión de esta medicación debe realizarse consultando previamente a su Médico.

2. RECOGIDA DE LA MUESTRA:

Después de haber realizado la dieta anterior durante 3 días, empezar a recoger la orina de 24 horas:

- 4º día: La primera orina de la mañana **NO** se recoge. Recoger todas las orinas sucesivas en el contenedor. Durante la recogida el frasco debe mantenerse refrigerado en nevera.
- 5º día: Recoger la primera orina de la mañana en el frasco.
- Tapar bien el frasco, cubrirlo completamente con papel de aluminio y llevarlo al laboratorio.